

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Csontgyulladás kezelése felmetszéssel (latinul: incisio)

Mi a csontgyulladás?

Az elhalt, esetleg törött fogon keresztül a fertőzés ráterjed a fog gyökerének csúcsára és az azt övező csontra, és gyulladást eredményez. Ennek eredményeként a fog körüli szövetek meggyengülnek, kilazul a fog, mozgathatóvá válik, ráharapásra fájdalmas.

A **gyulladás** következménye láz és duzzanat is lehet. Ekkor már az íny alatti csont is be van gyulladva. A csontgyulladás következtében felszaporodó genny levezetése (ha nagyon sok van) csak metszéssel lehetséges.

A metszés menete

A duzzanat területén 0,5-1 cm hosszú metszést ejtünk, hogy a genny kifolyhasson, lehetővé téve a gyorsabb gyógyulást. Ekkor vérzés is felléphet (a gyulladt terület vérbő). A seb a vérárvadás következtében hamar zárul, ezért néha, hogy a genny még hosszabb ideig távozhasson drain (géz vagy gumi) csíkot helyez az orvos a nyílásba.

Szövődmények, veszélyek

A metszés vérzést okoz, mely később (5-10 perc) csillapszik. Ismételt jelentkezésekor forduljon orvoshoz! Ha a gyulladás nem javul, **fokozódik a duzzanat** vagy visszatér, azonnal jelentkezzen fogorvosánál! **Ha antibiotikumot kell szednie**, akkor pontosan tegye azt legalább 7-10 napig!

Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy metszés során a szike ideget sért. Ekkor **az arc/száj egy része hosszabb ideig, akár 3-6 hónapig is zsibbadhat, érzéketlen lehet! A zsibbadás akár állandó is lehet!**

Beavatkozás elmaradásának kockázatai

A fogeredetű gyulladások jelentős kockázatot jelentenek, lázzal, szájjárral, fájdalommal járnak és a fog, illetve az állkapocs körüli szövetekre terjedhetnek.

Gyenge immunrendszer (háttérbetegségek) esetén ún. „phlegmone” alakulhat ki. Nem megfelelő kezelés esetén elhúzódó fájdalom, duzzanat, láz miatt munkaképtelenség alakulhat ki vagy súlyos esetekben akár kórházi kezelésre is szükség lehet

Javasolt életmód otthoni teendők

A sebbe helyezett draint a kezelőorvos távolítja el a következő ellenőrzésen vagy az orvos utasításának megfelelően otthon kell eltávolítani. Ha véletlenül magától kiesik, nem kell megijedni nem történik semmi probléma.

Javasolt fogmosás után **Corsodyl®/Curasept®-tel** történő szájöblítés, napi 2-3 alkalommal, ez fertőtleníti a szájüreget. Este az összes fogát mossa meg, másnap reggeltől óvatosan a seb közvetlen környékét is meg kell mosni (**a sebbe ne nyúljon bele!**), bő fogkrémes habbal.